

Als beperking van dit onderzoek moet worden genoemd dat enkele vragen van de enquête een hoge non-respons kenden. Dit kan de resultaten vertekenen.

Uit dit inventariserende onderzoek blijkt dat er enige maanden na het verschijnen van de beide documenten nog aandacht besteed moet worden aan het vergroten van hun bekendheid. Hoewel in de Nederlandse ziekenhuizen moeite wordt gedaan deze te implementeren, moeten er nog essentiële delen van de LSKA en de Leidraad worden ingevoerd, in het bijzonder een aantal indicatoren zoals benoemd in de LSKA.

Onze dank gaat uit naar Nina Winters en Daphne Philbert voor het beheer van de gegevensbase.

Geen belangenverstrengeling gemeld.

## Literatuur

- 1 Leendertse AJ, Egberts AC, Stoker LJ, van den Bemt PM; HARM Study Group. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. *Arch Intern Med.* 2008 sep 22;168(17):1890-6.
- 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg. Keten trombosezorg niet sluitend. Risico's door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen. Den Haag: Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 okt. [http://www.fnt.nl/media/docs/externe\\_publicaties/Rapport\\_IGZ\\_Keten\\_trombosezorg\\_niet\\_sluitend.pdf](http://www.fnt.nl/media/docs/externe_publicaties/Rapport_IGZ_Keten_trombosezorg_niet_sluitend.pdf). Geraadpleegd 2015 feb 2.
- 3 Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. Landelijke standaard ketenzorg antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg. Utrecht: CBO; 2012 nov. [https://www.hartenvaatgroep.nl/uploads/media/Landelijke\\_Standaard\\_Keten\\_Antistolling.pdf](https://www.hartenvaatgroep.nl/uploads/media/Landelijke_Standaard_Keten_Antistolling.pdf). Geraadpleegd 2015 feb 2.
- 4 Werkgroep NOACs van de wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten. Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen. 2012 nov. [www.nvpc.nl/uploads/stand/NVPC121117DOC-MW-Orde\\_Leidraad+NOAC\\_pdf118.pdf](http://www.nvpc.nl/uploads/stand/NVPC121117DOC-MW-Orde_Leidraad+NOAC_pdf118.pdf). Geraadpleegd 2015 feb 2.
- 5 Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Utrecht: Actiz; 2008 apr 25. [www.medicatieoverdracht.nl/uploaddb/download\\_object.asp?atoom=9008&VolgNr=1](http://www.medicatieoverdracht.nl/uploaddb/download_object.asp?atoom=9008&VolgNr=1). Geraadpleegd 2015 feb 2.
- 6 Horikx A, Wiltink E. Het veld aan de slag. Ketenzorg antistolling moet sluitend worden. *Pharm Weekbl.* 2012 mrt 16;147(11):13.
- 7 ten Cate H, Wiltink EHH. Noodzaak ketenzorg trombosebehandeling. *Apotheek Actueel.* 2012 okt 2;[2].

## NEDERLANDS FARMACEUTISCH ONDERZOEK IN DE INTERNATIONALE LITERATUUR

2015;9:E1515

# Lage implementatie van indicatie op recept

Willemijn Meijer

Tijdens het voorschrijven kunnen medicatiefouten optreden, bijvoorbeeld doordat voor verschillende indicaties van eenzelfde middel verschillende doseringen bestaan. Door het vermelden van de indicatie op het recept kunnen zulke fouten worden voorkomen. Voor 39 geneesmiddelen is dit sinds januari 2012 verplicht.

Holsappel e.a. hebben in 22 apotheken alle receptregels geanalyseerd van patiënten die tussen april en november 2012 van de huisarts een of meer recepten ontvingen voor een van deze 39 geneesmiddelen. Van al deze regels waren 11,4% (n = 46.699) voor een van deze 39 geneesmiddelen. Op 12,5% van deze recepten was de indicatie inderdaad vermeld. Op de overige recepten van deze patiënten, waarvoor het niet wettelijk verplicht is de indicatie op het recept te noteren, werd in 15,5% van de gevallen een indicatie vermeld. De studie liet grote verschillen zien tussen de verschillende apotheken in het percentage recepten met een indicatie (per apotheek 1,9-31,8% van de recepten). Ook

vonden de auteurs een grote spreiding in het vermelden van een indicatie bij de verschillende geneesmiddelen op de lijst van 39 verplichte middelen (0,0-70,8%). Indicaties werden vaker gerapporteerd voor kortdurende therapieën dan voor chronische therapie.

In deze studie werden daarnaast 528 patiënten uit 57 apotheken geïnterviewd. Slechts 11,7% van deze patiënten waren bekend met de wet die indicatie op het recept verplicht stelt. De meeste patiënten (91,1%) hebben geen probleem met het melden van de indicatie op het recept.

- Holsappel IG, Koster ES, Winters NA, Bouvy ML. Prescribing with indication: uptake of regulations in current practice and patients opinions in the Netherlands. *Int J Clin Pharm.* 2014 apr;36(2):282-6.

Meijer W. Lage implementatie van indicatie op recept. *PW Wetenschappelijk Platform.* 2015;9:e1515.