

Pijn

Het oorspronkelijk artikel van Swart (pagina 56) beschrijft hoe de praktijk van continue palliatieve sedatie bij oncologische patiënten verschilt met die bij niet-oncologische patiënten. Wat daarentegen gelijk is voor beide groepen patiënten, is dat pijn een van de doorslaggevende indicaties is voor continue sedatie. Pijn komt veel voor en goede behandeling ervan is belangrijk. Het is daarom ook in het veiligheidsmanagementsysteem een van de thema's: vroege herkenning en behandeling van pijn. Gelukkig hebben we een breed arsenaal aan geneesmiddelen die pijn bestrijden. Voor de opties bij palliatieve pijnbestrijding biedt www.pallialine.nl goede informatie.

Opiaten zijn in de palliatieve situatie eigenlijk altijd nodig. Een middel dat bij de meesten van ons niet vaak in beeld komt, maar wel een optie is bij therapiefalen van eerdere keuzen in de palliatieve situatie, is methadon. Dit middel grijpt niet alleen aan op de μ -receptor, maar is ook een NMDA-receptorantagonist. Hierdoor zou het ook kunnen werken bij neuropathische pijn. Het middel kent nadelen, zoals de lastige kinetiek, zodat instelling door een ervaren arts nodig is. Die nadelen zijn bij palliatieve toepassing wellicht minder relevant.

Ithamar Brinkman

Brinkman I. Pijn. PW Wetenschappelijk Platform. 2014;8:e1412.

Oorspronkelijke artikelen

56 Continue palliatieve sedatie bij oncologische en niet-oncologische patiënten

Siebe J. Swart, Judith A.C. Rietjens, Lia van Zuylen, Wouter W.A. Zuurmond, Roberto S.G.M. Perez, Paul J. van der Maas, Johannes J.M. van Delden en Agnes van der Heide

Korte bijdragen

65 Effectieve plasmaconcentraties van amoxicilline worden niet altijd bereikt met de intraveneuze standaarddosering

T. Havenith, M. Haeseker, A. Verbon, L. Stolk en C. Neef

69 Zijn intraveneuze ferrioxidesaccharaatpreparaten uitwisselbaar in de Nederlandse hemodialysepopulatie?

F.J.E. Lubberman, S. Selles, H.J. van der Zaag-Loonen, N.P.J. Vogtländer en R.M. Posthuma

Nederlands farmaceutisch onderzoek in de internationale literatuur

64, 72