

Wel risicocommunicatie, geen ETG-vergoeding

Een (ouder van een) potentiële geneesmiddelengebruiker staat voor lastige keuzes. Is het verstandig stoppen-met-roken-medicijnen te gebruiken met een grote kans op psychische stoornissen? Wil je zelf € 14,67 betalen voor maagbeschermers wanneer de zorgverzekeraar vergoeding niet belangrijk genoeg vindt? Moet je je zoon laten starten met antidepressiva of pleegt hij dan juist zelfmoord? Moeilijke afwegingen van positieve effecten van geneesmiddelen, risico's op bijwerkingen en andere aspecten.

Tot de zorgtaken van de apotheker behoort de begeleiding van patiënten die risico's rondom geneesmiddelen inschatten. Dat blijft niet beperkt tot begeleiding van de eerste uitgifte – een prestatie die per 1 januari afzonderlijk vergoed wordt. Of het zinvol is risicocommunicatie (bij eerste uitgifte) af te splitsen en apart te declareren, is twijfelachtig. De apotheker beantwoordt dagelijks vragen over bijwerkingen, kwaliteit van (generieke) farmaceutische producten en financiële gevolgen van bepaalde keuzes. Begeleiding bij de interpretatie van risico's dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van farmaceutische zorg: als professional wil je met individuele patiënten geen discussie over de noodzaak van je zorgtaken en de kosten daarvan. Niet omdat deze discussie niet gevoerd hoeft te worden, maar omdat je de aandacht niet van de zorgvraag wilt laten afleiden.

Een passende vergoeding voor risicocommunicatie kan op vele manieren geregeld worden, maar aparte vergoeding voor een terhandstellingsgesprek leidt tot tijdverspilling, onnodige bureaucratie en minder aandacht voor farmaceutische zorg.

Sander Borgsteede

Borgsteede S. Wel risicocommunicatie, geen ETG-vergoeding. PW Wetenschappelijk Platform. 2014;8:e1408.

Commentaren

- 20** Preventieve medicatie ter voorkoming van gastro-intestinale bloedingen bij gebruik van NSAID's en acetylsalicylzuur. Commentaar op de NHG-Standaard *Maagklachten*

Kayan Tsoi, Vesna M. Eimermann en Sander D. Borgsteede

Oorspronkelijke artikelen

- 26** Evaluatie van een stoppen-met-roken-interventie in de openbare apotheek

I. Jansen en S. Keizers

- 32** Het effect van de CBG-waarschuwing op de trend in SSRI-gebruik in Nederland van 1998 tot 2010

Maarten J. Bijlsma, Berdien E. Oortgiesen, Rik H.J. Beernink, Jens Bos, Bob Wilffert en Eelko Hak